



Knowledge grows

YaraVita™ BORTRAC

Folyékony bór tartalmú lombtrágya, a bórhiány megelőzésére és kezelésére.

Összetétel:

- 150 g/l bór
tömeg százalékban kifejezve: 11,1% B tartalom
- 65 g/l nitrogén
tömeg százalékban kifejezve: 4,7 % N tartalom

Szín: Átlátszó világos sárga folyadék

Kémhatás: 8,2

Sűrűség: 1,353 kg/l

Kiszerezés: 10 liter, nettó tömeg 13,7 kg

Fagyáspont: < -15°C



Magas bórtartalmával hozzájárul a gyökér- és a szállítószövetek kialakulásához, a virág- és termésképzéshez, a növényi tápanyagok felvételéhez és azok szállításához.



Bórhiányos szőlőfürt

A YaraVita™ Bortrac előnyei:

- Az egyedi formulázás miatt biztonságos és hatékony felhasználás
- Kedvező ár/érték arány
- Optimális tartamhatás
- Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő anyagot tartalmaz a hatékonyabb felhasználás érdekében.

Keverhetőség

A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó körülmények miatt minden esetben végezzen keverési próbát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon is tájékozódhat.

Felhasználási útmutató

Termés	Alkalmazás	Vízmennyiség l/ha
Almafélék, körte	1 l/ha dózisban alkalmazzuk piros bimbós állapotban, a virágzás kezdetén, majd azt követően szíromhulláskor. 2 l/ha a betakarítás után, de még a levélhullás előtt.	400-1000
Borsó, bab	2 l/ha dózisban alkalmazzuk 10-15 cm-es állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg a kezelést.	200-400
Burgonya	1 l/ha dózisban alkalmazzuk a teljes kikelést követően. 10-14 nap múlva második kezelés javasolt szintén 1 l/ha adagban.	300-600
Cseresznye, meggy, szilva	1 l/ha dózisban alkalmazzuk rügyattanás előtt, majd fehérbimbós állapotban még egyszer. 2 l/ha a betakarítás után, de még a levélhullás előtt.	400-1000
Cukorrépa, cékla, takarmányrépa	2 l/ha dózisban alkalmazzuk 4-6 leveles állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg a kezelést.	300-600
Hagymafélék	1 l/ha dózisban alkalmazzuk, amint a megfelelő levélfelület kialakult. 10-14 nap múlva második kezelés javasolt.	300-600
Káposzta, kelbimbó, karfiol, karalábé, brokkoli	2 l/ha dózisban 4-6 leveles állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	300-500
Kukorica	2-3 l/ha adagban 4-8 leveles állapotban alkalmazzuk.	200-400
Napraforgó	2 l/ha 4-8 leveles állapotban és 1 l/ha csillagbimbós állapotban.	200-400
Őszi káposztarepce	1-2 l/ha adagban alkalmazzuk a szármegnyúlás időszakában, 1 l/ha virágzás előtt.	200-400
Saláta (szabadföldi)	2 l/ha dózisban alkalmazzuk 10-14 nappal a palántázás után.	400-600
Sárgarépa és fehérrépa	3 l/ha dózisban alkalmazzuk 10-15 cm-es állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg a kezelést.	300-500
Szamóca és egyéb bogyósok	1 l/ha dózisban alkalmazzuk fehér bimbós állapotban, majd 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Betakarítás után 2 l/ha dózissal kezeljük az állományt.	400-600
Szőlő	1 l/ha dózisban alkalmazzuk a fürtvirágzat kialakulásakor, és a virágrügyek megjelenésekor. Betakarítás után 2 l/ha dózissal kezeljük az állományt.	500-800

További információ:

Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com

Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com

Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-dunántúl, tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com

Dr. Termeg János szaktanácsadó, Észak-Dunántúl, tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com

Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország, tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com

Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, tel.: +36 30 6898 095, e-mail: andras.kovacs@yara.com-

Szabari Szabolcs szaktanácsadó, Közép-Alföld, tel.: +36 30 964 9513, e-mail: szabolcs.szabari@yara.com

Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944

Készült: 2017. január
www.yara.hu, www.yaravita.hu



A Yara Hungária Kft. odafigyel környezetére, ezért információs anyagait újrahasznosított papírra nyomtatja.

