



Knowledge grows

# A szamóca tápanyag-ellátása



## Legfontosabb tudnivalók

- Nagy tápanyag- és vízigényű növény
- A nitrogén, foszfor és kálium mellett fontos a magnézium, kalcium és vas ellátottság is.
- A virágzás és gyümölcserés közötti időszak kritikus a tápanyag- és vízellátás szempontjából.
- A több évig termő ültetvények esetében a tápanyag-ellátás a szürettel nem ér véget.
- A szamóca a tápelem hiányokra érzékenyen reagál.
- A tápanyagot viszonylag egyenletesen veszi fel.
- A szedés végéig a tápanyag felvétele dinamikusan emelkedik.
- Nitrogént a szedés után is igényel, a rügydifferenciálódás érdekében
- Só- és klórérzékeny növény

- 10 mm bogyónagyság elérése után lehetőleg ne használjunk ammónium tartalmú műtrágyát.

## Milyen műtrágyát használjak?

YaraMila™ Cropcare, összetett, klórmentes, komplex, mikroelem tartalmú melegen granulált műtrágya családot. Amennyiben van talajvizsgálati eredménye, ennek megfelelően válassza ki az összetételt. Ha nem rendelkezik talajvizsgálati eredménnyel, akkor a növény igényéből kiindulva kálium túlsúlyos műtrágyát válasszon.

## Fejtrágyázásra:

Fejtrágyázásra használja a YaraLiva™ Nitrabor, a YaraMila™ Cropcare és a YaraBela™ Extran műtrágyákat.

## Lombtrágyázásra:

- Általános kondicionálásra: Használja az YaraVita™ Frutrel és YaraVita™ Universal Bio folyékony lombtrágyákat.
- Célzott kezelésre: Ha valamelyik mikroelemből nagyobb mennyiséget szükséges kiadni (abszolút vagy relatív hiány a talajban), használja a YaraVita™, egy vagy több mikroelemet tartalmazó lombtrágyáit.

## Tápoldatozás:

Intenzív technológiában az öntözéssel folyamatos tápanyag-ellátást is biztosítunk. A tápoldatozást talajtípus szerinti megosztással végezzük. A tápoldatozáshoz a vízdoldható komplex Ferticare™, a 100%-ban vízdoldható kiegészítő Krista™ műtrágya termékcsaládot és a YaraLiva™ Calcinit-et termékünket használjunk.

	Vegetatív növekedés kezdete Tápoldatozás, Lombtrágyázás	Virágzás előtt Tápoldatozás, Lombtrágyázás	Virágzás	Terméskötődés, termésnövekedés Fejtrágyázás Lombtrágyázás	Zsendülés, érés Tápoldatozás, Lombtrágyázás	Szedés közben Tápoldatozás, Lombtrágyázás	Betakarítás után Tápoldatozás, Lombtrágyázás
<b>Ferticare™</b>	15-30-15 50 kg/ha	14-11-25 30 kg/ha, 24-8-16 30 kg/ha	14-11-25 30 kg/ha		10-5-26 25 kg/ha	14-11-25 25 kg/ha	14-11-25 25 kg/ha
<b>Krista™</b>			MgS 25 kg/ha	K Plusz 50 kg/ha	K Plusz 50 kg/ha	K Plusz 50 kg/ha	
<b>YaraLiva™</b>			Calcinit 40 kg/ha	Calcinit 40 kg/ha		Calcinit 40 kg/ha	
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha, Bortrac 1 l/ha	Frutrel 5 l/ha		Frutrel 5 l/ha **, Stopit 5 l/ha	Seniphos 5 l/ha	Stopit 5 l/ha Seniphos* 5 l/ha	Frutrel 5 l/ha, vagy Zintrac 2 l/ha és Bortrac 1 l/ha

\*A tápoldat koncentrációja vízminőségtől függően 0,1-0,15% legyen.

\*\*Betakarítás előtt egy hónappal